

## ブロッコリー品種特性表

サカタ交配

品 種	項 目	熟期(日) (播種後)	草丈(cm) (頂花蕾までの高さ)	草姿	頂花蕾の特性			播種期		株数/10a
					直径(cm)	重量(g)	粒の大小	春	夏	
おはよう		95	30	立	15	400	小	○	○	3,500~4,000
ウインタードーム		150	40	立	15	500	小	—	○	4,000~4,500
サマードーム		95~105	40	極立	15	400	小	○	○	3,500~4,000
グランドーム		120	40	やや立	15	450~500	小	○	○	3,500~4,000
グリーンキャノン		115	40	立	15	400	小	—	○	3,500~4,000
ピクセル		90	40	やや立	15	350	小	○	○	3,500~4,000
さわ 沢ゆたか		100	40	立	15	350	小	—	○	3,500~4,000
りょく 緑嶺		105	40	半開	15	350	小	○	○	3,500~4,000
りょく 緑帝		110	40	やや立	14	350	小	○	○	3,500~4,000
茎ブロッコリー スティックセニョール		90	55	立	12	250	中	○	○	3,000

## ブロッコリー栽培型と適応品種

栽培地	月	月												適 応 品 種	備 考		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
ブ ロ ッ コ リ ー	高冷地 冷涼地			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			} おはよう、ピクセル } サマードーム } 緑嶺、緑帝 } グランドーム	標高や緯度によって、播種期が異なります。地域にあった播種期を選びましょう。
	一般地	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	} ピクセル、サマードーム } おはよう、沢ゆたか } ピクセル、おはよう、サマードーム } 緑嶺、緑帝 } グリーンキャノン } グランドーム } ウインタードーム	アントシアンの発生を嫌う場合「おはよう」を使用するとよいでしょう。
	暖地	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	} ピクセル、サマードーム } おはよう、沢ゆたか } ピクセル、おはよう、サマードーム } 緑嶺、緑帝 } グリーンキャノン } グランドーム } ウインタードーム	
茎ブロッコリー	高冷地 冷涼地			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			} スティックセニョール	長期間にわたる収穫になるので、しっかり株をつくりましょう。
一般地	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	} スティックセニョール		
暖地	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	} スティックセニョール		

(注) 日数は掛川総合研究センター(静岡県)における適作型での播種後の日数です。

■ 「Myドーム」シリーズ 栽培型

栽培地	品種名	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	ここがオススメ!
高冷地 冷涼地	サマー ドーム		●-----●				■							目を引くこと間違いなしの、抜群の秀品
一般地 暖地	サマー ドーム	●-----■				●-----●			■				●-----	耐暑性を生かして品薄な時期の出荷にもオススメ
	グラン ドーム		■				●-----●			■			●-----●	お得感満載のビッグサイズブロッコリー
	ウィンター ドーム	■					●-----●					■	■	買って満足のたっぷり重量感

(注)日数は掛川総合研究センター(静岡県)における適作型での播種後の日数です。